

adiHepa^{SOL}[®]

Doplnkové
krmivo v tekutej
forme

AdiFeed[®]

Dobré zásady sa vyplatia

adiHepa^{SOL}[®]

je tekutá koncentrovaná zmes rastlinných extraktov s obsahom fytozložiek, vitamínov, mikroelementov a organických kyselín. Tieto látky podporujú komplexné fungovanie parenchymálnych orgánov. Prípravok vykazuje dlhodobý účinok:

Lipotropný (reguluje tukový režim a trávenie tukov),

Hepatoprotektívny (ochrana pečeneňového parenchýmu),

Nefroprotektívny (ochrana obličiek),

Detoxikačný, žlčopudný a žlčotvorný.

Fytozložky v prípravku adiHepa^{SOL}[®]

pôsobia selektívne na vnútorné orgány:

Bránia steatóze, cirhóze a fibróze parenchymatických orgánov.

Podporujú regeneráciu pečeneňových buniek, srdcového svalu a obličiek.

Podporujú apetít stimuláciou sekrécie enzýmov, žalúdočných štiav a žlči v tráviacom trakte.

Obmedzujú tvorbu ketolátok v období negatívnej energetickej bilancie.

Zlepšujú stráviteľnosť tukov a bielkovín.

Bránia vzniku zápalových reakcií a posilňujú imunitnú odozvu organizmu.

Zmierňujú škodlivé účinky mykotoxínov z krmív v pečeni a obličkách.

**CHRÁNI
A REGENERUJE
PEČEŇ**

**11
RASTLINNÝCH
EXTRAKTOV**

**11
VITAMÍNOV**

**11
ORGANICKÝCH
Kyselín**

Dávkovanie

Hydina:

0,5-1 L/1000 L vody

Ošípané:

Ciciaky: 0,05 - 0,1 ml/kg ž. hm.,

po predchádzajúcom nariadení s vodou (min. 1:5);

Výkrm prasiat: 0,1 ml/kg ž. hm.,

vždy po predchádzajúcom nariadení s vodou (min. 1:5).

Prežúvavce:

0,1 - 0,2 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariadení s vodou (min. 1:5)

Kožušinové zvieratá:

0,1 ml/kg ž. hm., po predchádzajúcom nariadení s vodou (min. 1:5)

Holuby všetkých druhov a okrasné vtáky:

1 ml/1 L vody

Doba podávania prípravku:

3 - 5 dní, v prípade potreby opakovane podávať po 14 dňoch.

Zloženie: 12 štandardizovaných bylinných extraktov, 11 organických kyselín, komplex vitamínov (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B12, C, H, inositol), betaín, sorbitol, glycerol.

Príprava prípravku na podávanie:

Pred použitím pretrepať. V priebehu riedenia prípravku chráňte tvár a oči. Prípravok je silne koncentrovaný. Po nariadení sa stane priehľadný, môže opaleskovať. Nezachytáva sa na filtroch medikátorov ani dávkovačoch vody.

Interakcia:

možno podávať súčasne s tekutými acidifikátormi a roztokmi elektrolytov.

Nepodávať súbežne s biopreparátmi.

Zachovať časový odstup min. 3 – 4 hodiny.

Kontraindikácia: nie je

Ochranná doba: nie je

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky v originálnom zavretom balení, 48 hodín po nariadení vo vode.

Skladovanie:

Skladovať v chlade a tme. Prípravok nesmie zmŕznúť. Prípravok pri teplote nižšej ako 10°C zvyšuje svoju lepivosť, aktívne látky môžu kryštalizovať. Chráňte pred deťmi. V prírodnom prostredí podlieha prípravok biodegradácii.

Balenie:

Plastový kanister 5 L

- pre hydinu, kožušinové zvieratá

Plastová fľaša 1 L

- pre prežúvavce

Dodáva:

BIOFERM[®]

BIOFERM SK, s.r.o.

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

tel: 0245 945 126, fax: 0245 647 058

bioferm.sk@bioferm.com

www.bioferm.com

